

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Проспан® Сироп от кашля

Торговое наименование
Проспан® Сироп от кашля

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Сироп

Состав

1 мл сиропа содержит
активное вещество:

сухой экстракт листьев плюща (5-7,5:1) – 7,000 мг

экстрагент: этанол 30 %

вспомогательные вещества:

вода очищенная, калия сорбат, кислота лимонная безводная, раствор сорбитола 70 % (кристаллизованный), камедь ксантановая, ароматизатор вишневый (2,5 мл раствора содержат 0,963 г сорбитола = 0,08 хлебной единицы).

Описание

Сироп коричневого цвета, слегка мутный с приятным фруктовым вкусом и запахом вишни.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие препараты

Код АТС R05CA

Фармакологические свойства

Растительный препарат. Содержит сапонины, тритерпеноиды, флавоноиды. Оказывает отхаркивающее, противокашлевое и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и облегчает ее отхождение. Обладает противомикробной активностью.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Детям в возрасте 2-4 лет только по назначению врача по 2,5 мл сиропа 3 раза в день. Детям в возрасте 5 лет по 2,5 мл сиропа 3 раза в день. Детям от 6 до 11 лет - по 5 мл 3 раза в день. Взрослым и детям старше 12 лет - по 5-7,5 мл 3 раза в день с помощью приложенного мерного колпачка.

Сироп нужно принимать утром, днем и вечером.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от характера и тяжести картины заболевания.

В легких случаях продолжительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2-3 дня после улучшения состояния пациента.

Rezept

17.05.2016



Kötter
20.05.2016

Перед каждым употреблением необходимо хорошо взбалтывать флакон.
После каждого приема флакон плотно закрывать!

Побочные действия

- редко слабительный эффект
- аллергические реакции

Debus

17.05.2016



Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- непереносимость фруктозы
- детский возраст до 2 лет из-за риска обострения симптомов респираторных заболеваний

20.05.2016

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.

Особые указания

Проспан® Сироп от кашля не содержит спирта, сахара и красителей. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 2,5 мл раствора содержат 0,963 г сорбитола = 0,08 ХЕ.

В качестве адсорбента для вытяжки терапевтически эффективного экстракта плюща используется 30 об. % этанола, который впоследствии в процессе сушки полностью удаляется из экстракта.

Применение препарата детям в возрасте 2-4 лет возможно только после консультации врача.

Беременность и период лактации

Поскольку отсутствуют данные по безопасности, не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Передозировка

Прием препарата в количествах, превышающих трехкратную дневную дозу, может вызывать тошноту, рвоту и диарею.

Лечение – симптоматическое.

Форма выпуска и упаковка

Сироп по 100 мл во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке вместе с мерным колпачком и инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание!

В процессе хранения, в связи с содержанием экстракта плюща, возможно легкое помутнение раствора и незначительное изменение вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Срок хранения

3 года. Срок хранения после вскрытия флакона 3 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфельден, Германия

Rechts

17.05.2016



Kötze
20.05.2016