

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата
ПРОСПАН® КАПЛИ ОТ КАШЛЯ



Торговое название: Проспан® Капли от кашля

Лекарственная форма: капли для приёма внутрь.

Состав

1 мл препарата содержит:

действующее вещество:

сухой экстракт листьев плюща (5-7,5:1) – 0,02 г

Экстрагент: этанол 30%

вспомогательные вещества: вода очищенная, сахарин натрия, этанол 96 %, анисовое масло, фенхелевое масло, мятное масло.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета с запахом спирта и фенхеля. В процессе хранения возможно образование небольшого помутнения и осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие препараты.

Код АТС R05CA.

Фармакологическое действие

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое, спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 2 лет из-за риска обострения симптомов респираторных заболеваний; алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан приём этилового спирта.

С осторожностью: заболевания печени, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение во время беременности и кормления грудью

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат рекомендуется лишь после предварительной консультации с врачом

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет по 24 капли 3 раза в день (50,4 мг сухого экстракта листьев плюща в день), детям 4-10 лет 3 раза в день по 16 капель (33,6 мг сухого экстракта листьев плюща в день) и детям 2-4 года 3 раза в день по 12 капель (25,2 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Капли следует принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать капли с небольшим количеством воды.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю.

Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней.



При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Приём дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 47 об. % этилового спирта.

Не содержит сахара, консервантов и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Форма выпуска

По 20 мл во флаконе из темного стекла, снабженные пробкой-капельницей и навинчиваемой крышкой. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

4 года. Срок хранения после вскрытия флакона 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.,
Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфельден,
Германия

Rezeptlos

17.05.2016



J. Köllge
20.05.2016



10.05.16
J. Köllge